

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 12-7-71 190526

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin n° 130 du mois de Juillet 1971

9 Juillet 1971

GRANDES CULTURES

MAIS

PYRALE DU MAIS

Le vol des papillons a commencé dans nos élevages depuis quelques jours.

En raison des températures actuelles, le nombre des captures dans les élevages risque de devenir rapidement important. Ainsi, une très forte activité de ce ravageur est à attendre dans les cultures de maïs.

Le contrôle des pontes nous permet de préciser que 8 à 10 pieds sur 100 pieds de maïs contrôlés, sont déjà porteurs d'une ou de plusieurs pontes dans les cultures les plus avancées de la HARDT.

Par contre, dans la plupart des cas, les cultures ne sont pas encore au stade considéré comme devant être atteint pour effectuer le traitement (50 % des panicules mâles bien visibles dans les cornets). Une intervention trop hâtive ne trouverait donc pas toute son efficacité.

Nous estimons que les attaques de Pyrale seront fortes cette année dans toutes les cultures de maïs et particulièrement dans la zone infestée de la HARDT.

En conséquence, nous recommandons de réaliser le traitement lorsque 50 à 60 % des panicules mâles seront bien visibles dans les cornets, de manière à ce que le maximum de produit soit retenu par les plantes. Il ne faut pas attendre le dégagement complet des panicules.

Choisir l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

BETTERAVES

PEGOMYIE - PUCERONS

Des dégâts importants de Pégomyie sont observés dans bien des parcelles et de nombreuses pontes sont encore présentes à la face inférieure des feuilles.

Dans les parcelles où un traitement contre les Pucerons se justifierait, il est vivement conseillé de profiter de cette intervention pour lutter contre la Pégomyie.

.../...

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis)

Les captures des papillons du deuxième vol en pièges alimentaires sont très fortes dans de nombreux postes de contrôle. On est donc en droit de s'attendre à des dégâts sérieux, tant de Cochylis que d'Eudémis.

Les viticulteurs ayant l'habitude de traiter avec des produits de type préventif, pourront intervenir les 12 et 13 Juillet.

En ce qui concerne le traitement curatif, la date d'intervention reste difficile à déterminer. En effet, le temps chaud va vraisemblablement raccourcir la période d'incubation des oeufs. Cette période ne peut être déterminée à l'avance.

Nous conseillons aux viticulteurs qui utilisent des produits de type curatif, de traiter dès l'apparition des premiers dégâts (grain prenant une coloration violacée). Bien observer les parcelles à partir du 15 Juillet.

Il est rappelé que les traitements en poudrage sont plus à recommander, surtout cette année où la protection des grappes doit être parfaite.

Dans le vignoble de CLEEBOURG, le traitement préventif devra être reculé de trois à quatre jours.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 130 publié le 6 Juillet 1971.